



ALQP006 - Test d'évaluation d'un déficit cognitif

Dernière mise à jour le: 12/01/2026



Les troubles cognitifs désignent beaucoup d'étiologies (dépression, addictions, troubles psychiatriques) et en particulier les démences, dont la maladie d'Alzheimer.

Alzheimer en chiffres, c'est environ 1 million de personnes touchées en France. Il s'agit donc de 8% des français de plus de 65 ans qui seraient atteints en 2020. Par ailleurs, on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France.⁽¹⁾

En France, 148 947 tests d'évaluation du déficit cognitif ont été cotés par 18 076 médecins généralistes en 2024, soit près de 27% de tests en plus comparé à l'année précédente.⁽²⁾



COTATION

Code : ALQP006
Tarif : 69,12 €

- La facturation comprend le diagnostic initial ou l'examen annuel de contrôle le cas échéant.
- Lors d'un premier test, il est possible d'y associer un test d'évaluation de la dépression.

Pour le calcul des cotations en quelques clics, rendez-vous [ici](#).

INDICATIONS

Une démarche diagnostique peut être proposée, notamment en cas de troubles de la mémoire, aux patients :

- se plaignant d'une modification récente de leur cognition ou de leur état psychique
- dont l'entourage remarque l'apparition ou l'aggravation de troubles cognitifs ou un changement psycho-comportemental non expliqué par une pathologie psychiatrique identifiée
- venant consulter ou étant hospitalisés pour un symptôme pouvant accompagner, révéler ou provoquer un déclin cognitif (chute, syndrome confusionnel, accident vasculaire cérébral, etc.)
- entrant ou en cours de séjour en structure d'hébergement

Le diagnostic précoce permet la mise en place d'une prise en charge médico-sociale et d'un accompagnement pour assurer une meilleure qualité de vie aux patients et aux aidants sur un temps plus prolongé. Cela permettrait également de limiter les situations de crise et pourrait retarder l'entrée en institution.

On doit retrouver dans le dossier médical du patient :

- **la mention du test utilisé**
- **les résultats**
- **la conclusion**

AIDE PRATIQUE

Réalisation de l'acte :

Les tests autorisant la cotation du test d'évaluation d'un déficit cognitif sont les suivants (3) :

- évaluation par Alzheimer Disease Assessment Scale [ADAS],
- évaluation d'un syndrome frontal,
- évaluation d'un trouble de la mémoire,
- évaluation d'un trouble du langage.
- évaluation d'une agnosie visuelle ou visuo-spatiale.

Les tests MMSE, de l'horloge et des 5 mots de Dubois sont les tests les plus utilisés.

**PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS PRÉSENTANT UN TROUBLE NEUROCOGNITIF
ASSOCIÉ À LA MALADIE D'ALZHEIMER OU À UNE MALADIE APPARENTÉE**

DESCRIPTION SUCCINE DES TEST ET DE LEURS PROPRIÉTÉS PSYCHOMÉTRIQUES

	EN BREF	REPÈRE TNC LÉGER	REPÈRE TNC MAJEUR	MG/DURÉE (min)	CM	SUIVI
MMSE¹ <i>Mini Mental State Examination</i>	<ul style="list-style-type: none"> Test global sensible à l'âge et au niveau éducatif N'évalue pas les fonctions exécutives, faussement négatif si niveau éducatif élevé 			> 15		
MOCA² <i>Montreal Cognition Assessment</i>	<ul style="list-style-type: none"> Test global : attention concentration, fonctions exécutives, mémoire épisodique, langage, praxies visuelles constructives, abstraction, calcul, orientation Faussement négatif si niveau éducatif élevé Faussement positif si niveau éducatif faible 			> 15		
GP-COG³ <i>General Practitioner Cognition</i>	<ul style="list-style-type: none"> Evalue plusieurs fonctions Adresse à mémoriser, date du jour, évocation d'événements récents, rappel de l'adresse Test patient (9 pts) complété par test entourage (6 pts) 			5		
6-CIT <i>6-Item Impairment Test</i>	<ul style="list-style-type: none"> Evalue plusieurs fonctions On note les erreurs : année (4 pts), mois (3 pts), adresse (5 éléments à mémoriser), heure (3 pts), distraction par calcul ou épeler à rebours, l'adresse (2 pts par erreur) Seuil > 7 			5 - 10		
MIS⁴ <i>Memory Impairment Screening</i>	<ul style="list-style-type: none"> Evalue la mémoire uniquement Apprentissage de 4 mots écrits « <i>souris, flûte, violet, pyjama</i> » avec indiquage On note succès ou échec de l'apprentissage après 5 essais. Si succès, rappel libre et indiqué après distraction : 2 pts si rappel libre, 1 pt si indiqué. Noter les intrusions 			5		
5 mots de Dubois⁵	<ul style="list-style-type: none"> Evalue la mémoire uniquement Test en 3 étapes. Une feuille avec 5 mots. 1 - Encodage : « Lisez à voix haute les 5 mots et essayez de les retenir. Tout en regardant la liste, demander « Nom de la boisson ». 2- Contrôle de l'encodage : sans la feuille, redire les 5 mots. Indice uniquement pour les mots oubliés. 1 pt par mot retrouvé. Si < 5, les mots ne sont pas enregistrés, répéter l'encodage (3 fois max). Si > 5, enregistrement effectif. Distraction 3 - Rappel libre et indiqué. Noter les intrusions. Score seuil = 10 et = 8 pour les plus de 80 ans 			5		
Codex	<ul style="list-style-type: none"> 2 épreuves (item) : un rappel différé de 3 mots et test de l'horloge simplifiée. Si erreur sur une épreuve : évaluation orientation spatiale 			5		

¹TNC trouble neurocognitif L (léger), M (majeur). Pt : point. 1 : Test américain, traduit et validé en français

²Test canadien, traduit et validé en français

³Test australien, traduit et validé en français

⁴Test britannique, liste de mots en français validée

⁵Test français

OUI NON

Liens vers les tests en français :

- MMSE : <http://www.sgca.fr/outils/mms.pdf>
- MOCA : <https://cnfs.glendon.yorku.ca/wp-content/uploads/2021/04/MoCA-8.3-French-Test-2017-051.pdf>

CONSEILS EN +

Un des diagnostics différentiels est la dépression. Elle peut être évaluée par le test d'Hamilton ou le MADRS (Cf. : la fiche à venir « Évaluation d'une dépression »).

RÉFÉRENCES ET SITES UTILES

(1) [Fondation Vaincre Alzheimer](#) (quelques chiffres sur la maladie)

(2) Extraction SNDS, 2023, ISPL - URML Pays de la Loire

(3) [CCAM](#)

[Convention médicale du 20 juin 2024](#)

[Ressources KitMédical : Test du MOCA \(Outil d'évaluation des fonctions cognitives\)](#)