

# Test d'évaluation d'un déficit cognitif



**Les troubles cognitifs désignent beaucoup d'étiologies (dépression, addictions, troubles psychiatriques) et en particulier les démences, dont la maladie d'Alzheimer.**



**Dans les Pays de la Loire, en 2014, 88 500 personnes étaient en affection longue durée pour maladie d'Alzheimer et autres démences. Chaque année, près de 4 000 nouveaux patients sont admis en ALD pour ces pathologies dans la région<sup>(1)</sup>.**

**Dans les Pays de la Loire, 2 413 tests d'évaluation du déficit cognitif ont été cotés par 632 médecins généralistes en 2017<sup>(1)</sup>.**

## COTATION

Code : ALQP006

Tarif : 69,12 €

- La facturation comprend le diagnostic initial ou l'examen annuel de contrôle le cas échéant.
- Lors d'un premier test, il est possible d'y associer un test d'évaluation de la dépression.

Pour le calcul des cotations en quelques clics, rendez-vous [ici](#).

## INDICATIONS

Une démarche diagnostique peut être proposée, notamment en cas de troubles de la mémoire, aux patients :

- se plaignant d'une modification récente de leur cognition ou de leur état psychique
- dont l'entourage remarque l'apparition ou l'aggravation de troubles cognitifs ou un changement psycho-comportemental non expliqué par une pathologie psychiatrique identifiée
- venant consulter ou étant hospitalisés pour un symptôme pouvant accompagner, révéler ou provoquer un déclin cognitif (chute, syndrome confusionnel, accident vasculaire cérébral, etc.)
- entrant ou en cours de séjour en structure d'hébergement

Le diagnostic précoce permet la mise en place d'une prise en charge médico-sociale et d'un accompagnement pour assurer une meilleure qualité de vie aux patients et aux aidants sur un temps plus prolongé. Cela permettrait également de limiter les situations de crise et pourrait retarder l'entrée en

institution.

**On doit retrouver dans le dossier médical du patient :**

- la mention du test utilisé
- les résultats
- la conclusion

## AIDE PRATIQUE

### RÉALISATION DE L'ACTE

Les tests autorisant la cotation du test d'évaluation d'un déficit cognitif sont disponibles [ici](#).

### CONSEILS EN +

Un des diagnostics différentiels est la dépression. Elle peut être évaluée par le test d'Hamilton ou le MADRS (Cf. : la fiche à venir « Évaluation d'une dépression »).

## RÉFÉRENCES ET SITES UTILES

<sup>(1)</sup> *Données SNDS 2017, tous régimes (exploitation caisse d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique)*

(2) [Site ameli.fr/accueil-de-la-ccam](http://Site.ameli.fr/accueil-de-la-ccam) (rechercher «ALQP006»)



OMNIPrat

Simple, fiable, rapide : [OMNIPrat.org](http://OMNIPrat.org),  
votre outil d'aide à la pratique en médecine générale

*Proposé par l'Union Régionale des Médecins Libéraux  
et l'Assurance Maladie des Pays de la Loire*